

# ENSOL-COX MN

(Anticoccidianos / Coccidicidas)

<b>Activo</b>	<b>Concentración</b>
Nicarbazina	8 gr
Maduramicina	0,75 gr
Excipiente csp	100 gr

## **Indicaciones de uso:**

Prevención y control de la coccidiosis en las aves. Indicado para pollos de engorde, reproductores y pollas de reposición.

## **Espectro de acción:**

Es activo contra los coccidios patógenos del género *Eimeria* spp., tales como *Eimeria tenella*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria acervulina*, *Eimeria maxima*, *Eimeria mitis*, *Eimeria mivati*, causantes de severos perjuicios económicos.

## **Características y modo de acción:**

Los principios activos están constituidos por un complejo bimolecular de 4,4 dinitro-carbanilida y 2-hidroxi-4,6-dimetilpirimidina y un ionóforo. Ambos, actúan sinérgicamente, ya que alteran distintas funciones biológicas de los coccidios. La nicarbazina actúa alterando el metabolismo energético del parásito, inhibiendo la síntesis de ácido fólico. La maduramicina afecta el transporte de iones a través de la membrana del parásito que provoca un desbalance iónico y agota las reservas energéticas. La sobreexigencia del metabolismo energético, combinado con la alteración del mismo, provoca la muerte del parásito. Conjuntamente, actúan sobre los esporozoítos y durante las primeras y últimas fases sexuales de los coccidios de las aves, así como también sobre la segunda generación de esquizontes, logrando reducir significativamente la cuenta de oocistos.

## **Administración:**

**ENSOLCOX NM** se administra vía oral. Puede ser utilizado como ingrediente en la preparación de núcleos, correctores dietarios, premezclas, suplementos alimenticios o alimentos completos. Una vez dosificado debe mezclarse adecuadamente para garantizar la homogeneidad de la preparación. En pollos de engorde, la administración es continua hasta su retiro pre-faena; en pollas de reposición es continua desde el primer día de vida hasta las 16 semanas de edad.

# ENSOL-COX MN

(Anticoccidianos / Coccidicidas)

## **Dosificación:**

500 g de ENSOLCOX NM por Tonelada de alimento final.

Consultar con el veterinario, para ajustar la dosificación de acuerdo a las necesidades del caso a tratar.

## **Precauciones, advertencias, restricciones y contraindicaciones:**

No administrar a gallinas ponedoras en producción de huevos para consumo humano. No administrar a otras especies animales. No asociar con otras drogas anticoccidiales. No utilizar para el tratamiento de brotes de coccidiosis. Las aves que consumen el producto, son más susceptibles al estrés calórico, por lo que se sugiere evitar su administración durante los meses calurosos del año. Respetar las dosis indicadas.

## **Período de retiro:**

Respetando las indicaciones de uso, requiere un período de retiro pre-faena mínimo de 5 (cinco) días.

**Presentación:** Bolsas de 20kg

**Vida útil:** En envase original cerrado se conserva por 2 años

Inscrip. SENASA: N° 09-186