

ENSOL-COX NS

(Anticoccidianos / Coccidicidas)

Activo	Concentración
Nicarbazina	8 gr
Salinomycin	8 gr
Excipiente csp	100 gr

Indicaciones de uso:

Prevención y control de la coccidiosis en las aves. Indicado para pollos de engorde, reproductores y pollas de reposición.

Espectro de acción:

Es activo contra los coccidios patógenos del género *Eimeria* spp., tales como *Eimeria tenella*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria acervulina*, *Eimeria maxima*, *Eimeria mitis*, *Eimeria mivati*, causantes de severos perjuicios económicos.

Características y modo de acción:

Los principios activos están constituidos por un complejo bimolecular de 4,4 dinitro-carbanilida y 2-hidroxi-4,6- dimetil-pirimidina (Nicarbazina) y un ionóforo (Salinomycin). Ambos, actúan sinérgicamente, ya que alteran distintas funciones biológicas de los coccidios. La nicarbazina actúa alterando el metabolismo energético del parásito, inhibiendo la síntesis de ácido fólico. La salinomycin afecta el transporte de iones a través de la membrana del parásito que provoca un desbalance iónico y agota las reservas energéticas. La sobreexigencia del metabolismo energético, combinado con la alteración del mismo, provoca la muerte del parásito. Conjuntamente, actúan sobre los esporozoítos y durante las primeras y últimas fases sexuales de los coccidios de las aves, así como también sobre la segunda generación de esquizontes, logrando reducir significativamente la cuenta de oocistos.

Administración:

ENSOLCOX NS se administra vía oral. Puede ser utilizado como un ingrediente en la preparación de núcleos, correctores dietarios, premezclas, suplementos alimenticios o alimentos completos. Una vez dosificado debe mezclarse adecuadamente para garantizar la homogeneidad de la preparación. Administrar en forma continua en la ración diaria de pollos de carne. En pollas de reposición es continua desde el primer día de vida hasta las 16 semanas de edad.

ENSOL-COX NS

(Anticoccidianos / Coccidicidas)

Dosificación:

500 g de ENSOLCOX NS por Tonelada de alimento final.

Consultar con el veterinario, para ajustar la dosificación de acuerdo a las necesidades del caso a tratar.

Precauciones, advertencias, restricciones y contraindicaciones:

No administrar a gallinas ponedoras en postura de huevos para consumo humano. Puede provocar reducción en la cantidad y calidad de los huevos. No administrar a conejos, equinos y pavos adultos. En los pollos de engorde durante el período de iniciación puede deprimir el crecimiento. Puede aumentar la susceptibilidad al estrés calórico. No asociar con tiamulina, oleandomicina, macrólidos, sulfas, halofuginona y etopabato.

Período de retiro:

Respetando las indicaciones de uso, requiere un período de retiro pre-faena mínimo de 5 (cinco) días.

Presentación: Bolsas de 20kg

Vida útil: En envase original cerrado se conserva por 2 años

Inscrip. SENASA: N° 11-183